Inn.Studie Stufe 1:
Länderübergreifende Bewertung

Deutschland
Schweiz
Österreich
Italien

Donau
Lech
Iller
Isar
Amper
Ammer
Würmtal
Loisach
Inn
Rott
Pram
Gurtenbach
Ach
Antiesen
Mattig
Enknach
Traun
Mangfall
Tegernsee
Rosenheimer Achen
Weiße Traun
Rote Traun
Saalach
Tiroler Achen
Weißbache
Großache
Brixentaler Ache
Ziller
Salzach
Melach
Sill
Ötztaler Ache
Pitze
Ruetz
Fagge
Gurglbach
Achensee
Walchensee
Kochelsee
Staffelsee
Starnberger See
Ammersee
Forggensee
Bodensee
Chiemsee
Wallersee
Königsee
Zeller See
St. Moritzsee
Silvaplanasee
Lunghinsee
Silsersee
Sils
Bregenzerach
Ill
Rhein
Alfenz
Litz
Rosanna
Sanna
Trisanna
Landquart
Tasnan
Clemgia
La Brancla
Hinterer Rhein
Albula
Landwasser
Spöl

München
Landshut
Freising
Augsburg
Landsberg
Neu-Ulm
Kempten
Bad Tölz
Garmisch-Partenkirchen
Füssen
Oberstdorf
Passau
Schärding
Obernberg
Mühldorf
Töging
Marktl
Altötting
Waldkraiburg
Kraiburg
Braunau a. I.
Burghausen
Ried im Innkreis
Wasserburg
Rosenheim
Raubling
Nußdorf
Oberaudorf
Kiefersfelden
Kufstein
Kirchbichl
Wörgl
Kramsach
Brixlegg
Jenbach
Schwaz
Wattens
Innsbruck
Hall in Tirol
Zirl
Telfs
Imst
Ötz
Landeck
Prutz
Pfunds
Samnaun
Martina/Martinsbruck
Scuol
Susch
Zernez
Zuoz
Samedan
Sankt Moritz
Silvaplana
Livigno
Bludenz
Chur
Davos Platz
Traunstein
Salzburg
Mayrhofen
Kitzbühel
Sölden
Sterzing/Vipiteno
Merano
Bolzano

0 20 km

Karte 1.3

Legende

Bewertung auetypische Lebensräume

- sehr hoch
- hoch
- mittel
- gering
- nicht bewertet
- nicht bewertete Abschnitte mit Kiesbänken (nur CH)